Identifichiamo le principali piante ed arbusti del Laghetto di Muzzano (NON per altri posti!)

pro natura Ticino

Foglie

- Monocotiledoni:
  - foglie tipo erbaceo
  - nervature lineari
  - erbacee (eccetto bambù)
  - erbacee
    - f. larghe 1 a 3 cm, lunghe
      - fiori riuniti in cilindro vellutato → Lisca maggiore (*Typha latifolia*)
      - fiori gialli → Iris giallo (*Iris pseudacorus*)
    - f. larghe max. 1 cm (in genere)
      - stelo rotondo con nodi → Graminacee tra cui l'acquatica Canna palustre (*Pragmites australis*)
      - stelo senza nodi → Carici (*Carex div. sp.*)
  - legnose → Bambù (diverse specie)
- Dicotiledoni:
  - foglie non di tipo erbaceo
  - nervature non parallele
  - legnose
  - f. semplici
    - f./rami alterni
      - Inerme
        - f. lobate
          - senza lattice → Platano (*Platanus sp.*)
          - con lattice → Gelso bianco (*Morus alba*)
        - f. ovali intere
          - f. ± pelose
            - picciolo peloso-ghiandoloso → Nocciolo (*Corylus avellana*)
            - picciolo glabro
              - f. ovali → Salice cinerea (*Salix cinerea*)
              - f. lanceolate → Salice bianco (*Salix alba*)
          - f. glabre
            - stelo cavo → Fitolacca (*Phytolacca americana*)
            - stelo legnoso
              - 2 ghiandole sul picciolo
                - fiori 1 a 5 → Ciliegio (*Prunus avium*)
                - f. coriacee, fi e fr. a grappolo → Pruno autunnale (*Prunus serotina*)
              - picciolo senza ghiandole
                - frtutti carnosi
                - albero, f. 5-20 cm, pelose sotto → Caco (*Diospyros cachi*)
                - arbusto, f. 2 a 5 cm, glabre → Frangola (*Frangula alnus*)
                - frtutti secchi ("semini")
                - frutti: acheni contenuti in pignette (amenti) → Ontano nero (*Alnus glutinosa*)
                - frutti: semini con ampia ala trilobata → Carpino bianco (*Carpinus betulus*)
    - f./rami opposti
      - spine o aculei
        - f. lobate → Biancospino (*Crataegus sp.*)
        - f. ovali intere
          - f. 1-1.5 volte più lunghe che larghe → Pero selvatico (*Pyrus pyraster*)
          - f. > 2 volte più lunghe che larghe
            - f. verdi sotto → Nespolo (*Mespilus germanica*)
            - f. argentate sotto → Olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides*)
- Conifere:
  - forma pigne
  - foglie a forma di aghi disposti a piuma.
  - → Cipresso calvo (*Taxodium distichum*)
- f. composte
  - f./rami alterni
    - inerme
      - margine f. intero → Noce (*Juglans regia*)
      - margine f. seghettato → Sorbo d. uccellatori (*Sorbus aucuparia*)
    - spine o aculei
      - f. pennate, spine diritte → Robinia (*Robinia pseudoacacia*)
      - f. pennate, aculei arcuati → Rosa selvatica (*Rosa div. sp.*)
      - f. palmate → Rovo (*Rubus sp.*)
  - f./rami opposti
    - rami con lenticelle → Sanbuco (*Sanbucus nigra*)
    - rami senza lenticelle → Frassino (*Fraxinus excelsior*)
  - f. intere
    - f. lanceolate pelose → Buddleia (*Buddleja davidii*)
    - f. lanceolate non pelose → Fusaggine (*Euonymus europaeus*)
    - f. ovali
      - f. molto pelose → Metallo (*Viburnum lantana*)
      - f. glabre o poco pelose
        - peli all'ascella delle nervature → Corniolo (*Cornus mas*)
        - senza peli all'aceslla delle nervature → Sanguinello (*Cornus sanguinea*)
  - f. lobate
    - f. glabre con ghiandole sul picciolo → Palla di neve (*Viburnum opulus*)
    - f. senza ghiandole → Acero di monte (*Acer pseudoplatanus*)